

## SKUBIOS PAGALBOS MASTO LENTELĖ

Skubios medicinos pagalbos kategorija	Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą	Kategorijos apibūdinimas	Ūmios būklės arba skubios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1	2	3	4
<b>1 kategorija</b>	Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.	Gyvybei grėsmingi atvejai: gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Širdies sustojimas.</li> <li>2. Kvėpavimo sustojimas.</li> <li>3. Gręsiantis kvėpavimo sustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.</li> <li>4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis &lt;8 k/min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo dažnis &lt; 10 k/min.</li> <li>5. Suaugusiųjų sistolinis AKS &lt; 80 mmHg, kūdikis, vaikas ištiktas dekompensuojamo šoko.</li> <li>6. Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glasgow komų skalę &lt; 9 balų.</li> <li>7. Stebimi viso kūno traukuliai.</li> <li>8. Intraveninis medikamentų arba narkotikų perdozavimas su hipoventiliacija ir hipodinamikos sutrikimu.</li> <li>9. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ir aplinkiniams.</li> </ol>
<b>2 kategorija</b>	Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo įstaigą. Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai atliekami vienu metu.	Atvejai, kai nesuteikus skubios medicinos pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei: Pavojinga būklė, kai paciento būklė sunki arba blogėja taip sparčiai, kad yra potenciali grėsmė jo gyvybei arba gresia organų nepakankamumas, jei medicinos pagalba nebus pradėta teikti per 10-15 min. nuo atvykimo į staigą, arba atvejai,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kritiška kvėpavimo takų būklė - stridoras arba patologinis seilėtekis.</li> <li>2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.</li> <li>3. Ūmus kraujotakos sutrikimas: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. šalta, drėgna, marmurinė oda, bloga perfūzija (kapiliarų prisipildymo laikas &gt;5s),</li> <li>3.2. suaugusiųjų ŠSD &lt;50k/min. arba &gt;150k/min., naujagimių ŠSD &lt;100k/min. arba &gt;200k/min., kūdikių ŠSD &lt;80k/min. arba &gt;200k/min., vaikų iki 8 m. ŠSD &lt;60k/min. arba &gt;180 k/min.,</li> <li>3.3. hipotenzija su audinių perfūzijos sutrikimu.</li> </ol> </li> <li>4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25% arba daugiau) netekimas.</li> <li>5. Labai stiprus ūmus skausmas 9-10 balų dėl įvairių priežasčių, tarp jų - širdies, pilvo skausmas ar ektopinis nęštumas.</li> </ol>

		<p>kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme: Kai reikalingas ypatingai skubus gydymas (trombolizė, antidotai), nuo kurio poveikio gali priklausyti klinikinės baigties rezultatai, arba ypatingai stipraus skausmo atvejai: kai reikia per 10 min. nuo atvykimo į įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Gliukozės kiekis kraujyje &lt;2 mmol/l.</li> <li>7. Miegoistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GKS&lt;10 balų).</li> <li>8. Karščiavimas arba bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais.</li> <li>9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.</li> <li>10. Politrauma, kai reikalinga skubi organizuota medikų brigados pagalba.</li> <li>11. Ūmi lokali trauma- didžiųjų kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai, amputacijos.</li> <li>12. Didelės rizikos anamnezė: <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas,</li> <li>12.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas,</li> <li>12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).</li> </ol> </li> <li>13. Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ol style="list-style-type: none"> <li>13.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams,</li> <li>13.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.</li> </ol> </li> </ol>
<b>3 kategorija</b>	<p>Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į ASPĮ.</p>	<p>Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į įstaigą, arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios, arba kai reikia per 30 min. nuo atvykimo į įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais objektyviais širdies-kraujagyslių ir/ar CNS pažeidimo požymiais.</li> <li>2. Vidutiniškai sunkus nukraujavimas dėl bet kokios priežasties.</li> <li>3. Miegoistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GKS &lt;13 balų)</li> <li>4. Oksigenacija &lt;90%.</li> <li>5. Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.) valandų anamnezėje,</li> <li>6. Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.) vėmimas.</li> <li>7. Ūmi dehidratacija.</li> <li>8. Galvos trauma su trumpalaikiu sąmonės netekimu.</li> <li>9. Vidutinio stiprumo skausmas, vertinamas 7-8 balais, kai reikia skubaus nuskausminimo.</li> <li>10. Ūmus pilvo skausmas be didelės rizikos požymių, kai pacientui &gt;65 m., vertinamas ne mažiau kaip 8 balai.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.</li> <li>12. Vidutinio sunkumo galūnės sužalojimas su deformacija, laceracija ar suspaudimo sindromas.</li> <li>13. Vaikai iki 8 m., kuriems pagal anamnezę ir stebimus klinikinius požymius yra potenciali grėsmė gyvybei.</li> <li>14. Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė,</li> <li>14.2. ūmios psichozės,</li> <li>14.3. sunki psichologinė trauma, dezorientuojanti elgesį,</li> <li>14.4. sunki depresija,</li> <li>14.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.</li> </ul> </li> <li>15. Kiauryminis akies sužalojimas.</li> </ul>
<b>4 kategorija</b>	Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į ASPĮ.	Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į ASPĮ arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo atvykimo į ASPĮ pasekmės gali būti sunkios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Šlapimo sulaikymas, anurija.</li> <li>2. Galvos kaulų traumos be sąmonės sutrikimo.</li> <li>3. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukuliai; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).</li> <li>4. Pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.</li> <li>5. Traumos ir nelaimingi atsitikimai.</li> <li>6. Erkių įsisiurbimai.</li> </ul>